

Doenças	Sinais e sintomas	Observação	Região corpo
<b>Herpes Genital</b>	Ardência, coceira, vermelhidão, dor local, bolhas e feridas, inchaço, febre, corrimento vaginal ou secreção do pênis.	Feridas que duram de 1 a 3 semanas, depois desaparecem mesmo sem tratamento, entretanto as pessoas continuam infectadas.	Genital ou anal.
<b>Sífilis primária 1ª fase (cancro duro)</b>	Ferida única, indolor e caroço. Surgem de 1 a 12 semanas após o contágio, desaparecendo após 1 a 6 semanas.	As feridas podem não apresentam dor e são acompanhadas de ínguas na virilha.	Grandes lábios, vagina, clitóris, colo do útero, glânde e prepúcio.
<b>Sífilis secundária 2ª fase</b>	Mancha: principalmente palmas das mãos e plantas dos pés, também no tronco e ínguas pelo corpo.	Os sintomas surgem até 6 meses após o contágio ou do aparecimento do cancro. Nesta fase não existem manifestações visíveis, mas os exames são positivos e ocorre a contaminação.	Todo o corpo.
<b>Sífilis terciária 3ª fase</b>	Nódulos, estenose coronária e miocardite, ossos e cérebro, podendo levar a morte.	Ocorre de um a vários anos após o contágio.	Pele, coração, ossos e cérebro.
<b>Sífilis congênita</b>	Ulceração com a base mole, com pus, caroços na virilha que se rompem e soltam pus.	Ocorre a infecção do feto pelo treponema pallidum, através da placenta a partir do 4º mês de gestação.	Vaginal, pênis e anal.
<b>Linfogranuloma venéreo</b>	Abscesso, inchaço, dor, secreção purulenta.	Ferida de curta duração (3 a 5 dias). Depois surgem caroços na virilha, que se rompem e soltam pus.	
<b>Gonorréia</b>	Corrimento vaginal, anal e do pênis. Dor ao urinar e nas relações sexuais.	A maioria das mulheres não apresentam sintomas. Na gestação, podem ser transmitidas no parto, causando cegueira no bebê.	
<b>Tricomoníase</b>	Corrimento amarelo ou esverdeado, mau cheiro, coceira e dor no ato sexual, podendo não apresentar sintomas.	Os parceiros, mesmo não apresentando sintomas, necessitam fazer o tratamento.	Pênis, vagina, vulva, e a cérvix uterina.
<b>Clamídia</b>	Apresenta ou não secreção esbranquiçada uretral escassa, transparente.	Geralmente matinal e ardor uretral ou vaginal.	
<b>Vaginose bacteriana</b>	Corrimento branco-amarelado não muito intenso, cheiro ruim (peixe-podre).	Ocorre principalmente depois do ato sexual ou no final da menstruação.	
<b>Candidíase</b>	Corrimento de cor branca, tipo leite coalhado.	Apresenta coceira intensa.	
<b>Condiloma acuminado "crista de galo"</b>	Verrugas não dolorosas, isoladas ou agrupadas.	Causado pelo vírus HPV (vírus do papiloma humano). Crescem mais rapidamente durante a gravidez e em pacientes com baixa imunidade. A falta de tratamento pode predispor ao câncer do colo uterino.	Oral, glânde, prepúcio, vulva, vagina e colo do útero, podendo aparecer no ânus e no reto.
<b>Hepatite B</b>	Hepatite crônica, cirrose hepática, câncer de fígado entre outras.	Infecção das células hepáticas suas complicações.	Fígado.